Neurofisiologia della visione

Vincenzo Parisi

IRCCS Fondazione G.B. Bietti, Roma

1

2

forma, colore, dimensioni,
contrasto, posizione nello
spazio,...

La Visione

La visione è la manifestazione di raffinati e complessi eventi neurosensoriali legati a fenomeni di traduzione dello stimolo luminoso in impulso nervoso

...e della trasmissione dell'impulso nervoso lungo le vie visive, cioè dalle cellule ganglionari retiniche fino alla corteccia cerebrale occipitale.

3

4

La retina

5

Cellule Fotorecettoriali:

Bastoncelli:

- rilevano stimoli di bassa intensità luminosa
- frequenza inferiore ai 12 Hz

Coni:

- mediano la visione dei colori
- alta risoluzione temporale (fino a 55 Hz)
- alta risoluzione spaziale (fino a 60 cicli/grado)

6

Cellule Fotorecettoriali: trasduzione dell'impulso luminoso in impulso elettrico:

- **al buio:** apertura dei canali del Na⁺ e del K⁺ → corrente al buio → rilascio di neurotrasmettitori
- **alla luce:** assorbimento di un fotone da parte di un pigmento situato nei dischi esterni dei fotorecettori: **la rodopsina** → ciclo del retinale chiusura dei canali del Na⁺ e del K⁺ → **fotocorrente** → iperpolarizzazione della membrana cellulare → riduzione del rilascio di neurotrasmettitori

7

8

La rodopsina:

- **proteina:** 348 aminoacidi
- la sintesi di tale proteina è regolata da geni presenti nel DNA.
- Anomale sequenze di nucleotidi dei geni → sostituzione di un aminoacido → mutazione della rodopsina
- La sostituzione del 23esimo aminoacido “prolina” → “istidina” (Pro 23 His)* → degenerazione del fotorecettore (perdita o assenza del segmento esterno)

→ **Retinite Pigmentosa**

* Dryja et al. Nature, N Eng J Med, 1990

Struttura Rodopsina

Mutazioni

Mutazione	Sequenza normale
Thr13met	C → T
Pro23His	C → A
Pro23Leu	C → T
Pro45Leu	C → C
Gly51Val	G → T
Thr59Arg	C → G
Del66-71	12 bp del
Val87Asp	T → A
Gly89Asp	G → A
Gly100Trp	G → T
Leu125Arg	T → G
Arg135Leu	GG → TT
Arg135Trp	C → T
Cys179Arg	T → C
Pro171Leu	CCC → CAC
Tyr178Cys	A → G
Gly181Cys	G → A
Gly182Ser	G → A
Ser189Pro	T → C
Gly188Arg	G → A
Asp190Asn	G → A
Asp190Gly	A → G
His171Pro	A → C
His259Del	3 bp del
Pro267Leu	C → T
Lys296Glu	A → G
Gln341Met	C → T
Val343Met	G → A
Pro347Arg	C → G
Pro347Leu	C → T
Pro347Ser	C → T

Attualmente circa 100 mutazioni note

9

10

La Retinite Pigmentosa

- Degenerazione retinica progressiva
 - Malattia genetica:
 - 19 % forma autosomica dominante (cromosomi 3, 6, 8)
 - 19 % forma autosomica recessiva
 - 8 % X-linked (braccio corto cromosoma X)
 - 46 % forma isolata in un membro della famiglia*
 - Differenti forme in relazione al tipo e alla localizzazione del fotorecettore colpito
 - Associata a diverse patologie (Sindrome di.....)
- * Bunker et al. , Am J Ophthalmol1984

11

12

Senso Cromatico

13

Retinite Pigmentosa associata a:

- Malassorbimento lipidico, disturbi neuromuscolari con atassia, acatocitosi, ↓ livelli sierici di colesterolo e trigliceridi (Abetalipoproteinemia ereditaria, **Sindrome di Bassen- Kornzweig**)
- Neuropatia periferica, atassia cerebrale, ↑ proteine liquido cerebrospinale e livelli sierici di acido fitanico (**Malattia di Refsum**)
- Sordità (**Sindrome di Usher I e II**)

15

Decorso della RP

- Tipo di fotorecettori colpiti
- Età di insorgenza
- Compromissione funzionale
- Valutazione di eventuali sindromi e relativo interessamento di altri organi o apparati

17

Campo Visivo

14

Retinite Pigmentosa associata a:

- Ritardo mentale, polidattilia, obesità del tronco e degli arti, ipogonadismo (**Sindrome di Laurence-Moon- Bardet-Biedl**)
- Ptosi, oftalmoplegia esterna cronica (**Sindrome di Kearns-Sayre**)
- Deterioramento psicomotorio, atassia epilessia, decadimento mentale (**Malattia di Batten nelle varie evoluzioni**)
- **Sindrome di Alstrom e Cockayne**

16

Cellule postrecettoriali:

Cellule amacrine, Muller, Interplexiformi:

- connettono più fotorecettori tra di loro e con le **Cellule bipolari:**
- alcune classi sono attivate (depolarizzazione) dal maggior rilascio di neurotrasmettitore da parte dei fotorecettori (**centro OFF**)
- alcune classi sono attivate (depolarizzazione) dalla diminuzione di rilascio di neurotrasmettitore da parte dei fotorecettori (**centro ON**)

18

Cellule postrecettoriali:

Cellule ganglionari:

- possono ricevere informazioni da 1 a 300 fotorecettori $\checkmark$
campionamento retinico: 1/300 nella periferia retinica, 1/1 nella fovea $\checkmark$ acuità visiva (massima nella fovea)
- Campi recettivi Centro ON $\checkmark$ attivati dalla luce ed inibiti dal buio
- Campi recettivi Centro OFF $\checkmark$ inibiti dalla luce ed attivati dal buio

19

Cellule postrecettoriali: Cellule ganglionari:

nella periferia retinica :

- grande soma (G. magnocellulari) e assone di grosso calibro (alta velocità di conduzione)
- responsive a basse frequenze temporali e spaziali, alle variazioni di luminanza

nella macula:

- piccolo soma (G. Parvocellulari) e assone di piccolo calibro (ridotta velocità di conduzione)
- responsive ad alte frequenze temporali e spaziali, alle variazioni di contrasto cromatico

20

ESPLORAZIONE ELETTOFUNZIONALE DELLA RETINA: L'ERG

21

L'ELETTORETINOGRAMMA (ERG)

- Risposta bioelettrica dell'intera retina ad uno stimolo visivo:
- Flash: lampo di luce stroboscopica
- Pattern: modello strutturato costituito da barre o scacchi che si alternano in modo cadenzato nel tempo

22

Generatori ERG

Approccio Farmacologico:

inattivazione dei fotorecettori o blocco delle sinapsi intraretiniche

Approccio "Degenerativo"

taglio del nervo ottico e degenerazione delle fibre ganglionari o modelli patologici con degenerazione delle fibre ganglionari.

23

Maffei e Fiorentini, Science, 1981

Dopo taglio del nervo ottico è stata osservata una progressiva diminuzione, fino alla scomparsa, del PERG. Tale modificazione elettroretinografica era associata alla degenerazione delle fibre e cellule ganglionari.

L'ERG da flash rimaneva invariato.

24

Viswanathan et al. IOVS 2000;

Experimentally-induced glaucoma or TTX treatment in monkey eyes:

- Reduction of PERG amplitude

25

Generatori Elettroretinogramma

⇒ Onda a ERG da Flash

} Onda b ERG da Flash
Potenziali Oscillatori

⇒ ERG da Pattern/PhNR

26

ERG da Flash:

FT 1 Hz, 1 J: Risposta transiente caratterizzata da:

- onda a:
- onda b
- onda c:

FT 1 Hz, 10 J: Potenziali Oscillatori

FT 10 e 20 Hz: Flicker, bastoncelli

FT 30 Hz: Flicker, coni

27

ERG da Flash:

aumento del tempo di latenza onda a e b, riduzione di ampiezza dell'onda a e b, PO in:

- retinite pigmentosa
- distacco di retina
- retinopatie tossiche
- amaurosi di Leber
- acromatopsia
- cecità notturna
- distrofie dei coni
- Vasculopatie (Diabete, Ipertensione)
- Occlusioni arteriose e venose
- Uveiti
-

NO IN PATOLOGIE MACULARI

28

ERG e Diabete

Visual electrophysiological responses in persons with type 1 diabetes

29

ERG da Pattern

- 1-2 Hz: Risposta transiente caratterizzata da serie di onde a polarità alternante negativa-postiva-negativa : N35, P50, N95
- > 8 Hz: risposta Steady-State: valutazione della risposta sulla armonica di frequenza doppia rispetto a quella di stimolazione (FFT, fase e ampiezza della II armonica)

30

ERG da Pattern

31

ERG da Pattern

32

ERG da Pattern: Lo stimolo visivo

- BARRE (gratings)
 - SCACCHI (checkerboard)
- se ne valuta:**
- **frequenza spaziale** (angolo sotteso dal singolo elemento: minuti di arco o cicli/grado)
 - **contrasto** (rapporto di luminanza tra gli elementi del pattern)
 - **frequenza temporale** (tempo di inversione)

33

PERG: Elettrodi

ERG jet

Henkes

DTL

Skin

34

ERG da Pattern: aumento del tempo di latenza picchi N35, P50 e N95, riduzione di ampiezza n35-P50 e P50-N95 (transiente), ritardo di fase e riduzione di ampiezza (steady-state) in:

- retinite pigmentosa
- maculopatie
- M. di Stargardt
- M. di Best
- degenerazione maculare senile
- diabete
- glaucoma
- neuriti ottiche (Indice di degenerazione retrograda nella SM)
- Parkinson

CONCOMITANZA DI PATOLOGIE: Abilità dignostica = 0

35

PhNR

36

Anomalie retiniche nelle patologie neurodegenerative

- 1) Glaucoma
- 2) Multiple Sclerosis
- 3) Alzheimer's Disease
- 4) CADASIL
- 5) Eredo-atassie

37

Correlazioni morfo-funzionali:
PERG, mfERG vs OCT

La valutazione “in vivo” delle fibre nervose retiniche

38

Morfologia: Optical Coherence Tomography (OCT)

- Tecnica ad alta risoluzione che fornisce immagini stratificate della retina dalle quali è possibile ottenere informazioni quantitative sullo strato delle fibre nervose.

- Tecnica analoga all'ecografia B-mode che al posto di un'onda acustica utilizza la riflessione di un'onda luminosa misurando il ritardo del fascio luminoso che incrocia lo strato delle fibre nervose.

- Circular scans
- diameter: 3.4 mm

39

PERG nei pazienti con Ipertensione Oculari o Glaucomatosi

40

41

Correlazione tra PERG e spessore del NFL in OHT e POAG

42

PERG and Ganglion Cell loss versus Automated Perimetry

43

PERG

44

Morpho-functional Correlations: Multiple Sclerosis

- Evaluation of RNFL thickness in MS patients with or without Optic Neuritis (NORB)

Correlation between Morphological and Functional Retinal Impairment in Multiple Sclerosis Patients

Vincenzo Parisi,^{1,2,5} Gianluca Manni,^{1,2} Maria Spalora,⁴ Giuseppe Colacino,^{1,2} Rita Restuccia,³ Stefano Marchi,³ Massimo G. Bucci,^{1,2} and Francesco Pirelli^{1,2,5}

Purpose. To assess whether a correlation exists between optic nerve fiber layer (ONL) thickness and the retinal or visual pathway function in multiple sclerosis (MS) patients previously affected by optic neuritis.

Methods. Fourteen patients with a diagnosis of definite MS were examined. All had been affected by optic neuritis (ON) with complete recovery of visual acuity (14 eyes included in study). These were compared with 14 eyes from 14 age-matched control subjects. ONL thickness was measured by optical coherence tomography (OCT). Three different measurements in each quadrant (superior, inferior, nasal, and temporal) were taken and averaged. The data in all quadrants (12 values averaged) were obtained as ONL thickness, whereas the data obtained in the temporal quadrant only (3 values averaged) were obtained as NFL thickness. Retinal and visual pathway function was assessed by simultaneously recording pattern electroretinograms (PERG) and visual evoked potentials (VEP) using high-resolution (HR) checkered stimuli subtending 10 minutes and 60 minutes of the visual arc (from arc) and recorded at the rate of two reversals per second.

Results. In MS eyes there was a significant ($P < 0.01$) reduction in NFL thickness in both NFL Overall and NFL Temporal evaluation compared with the values observed in control eyes. PERG (15-min arc) and VEP (6-min arc) and obtained a significant ($P < 0.01$) delay in latency and reduction in amplitude. NFL Overall and NFL Temporal values were significantly correlated ($P < 0.01$) to the PERG P50 latency and P50 to VEP amplitude recorded with 15-min arc checks. The correlations ($P < 0.01$) between NFL values and the other electrophysiological data (PERG recorded with 6-min arc) and VEP recorded with 15-min arc and obtained arc checks were found.

Conclusions. There is a correlation between PERG changes and NFL thickness in MS patients previously affected by optic neuritis, but there is no correlation between VEP changes and NFL thickness. <https://doi.org/10.1167/10.12.01>

528 citazioni

45

Morpho-functional Correlations: Multiple Sclerosis

The RNFL thickness was also reduced in MS eyes without NORB!

46

Morpho-functional Correlations: Alzheimer's Disease

47

Morpho-functional Correlations: Alzheimer's Disease

PLOS ONE
RESEARCH ARTICLE
Optical Coherence Tomography in Alzheimer's Disease: A Meta-Analysis
Vincenzo Parisi, Stefano Marchi, Massimo G. Bucci, Maria Spalora, Giuseppe Colacino, Rita Restuccia, Gianluca Manni, Francesco Pirelli, and Vincenzo Parisi

OCT versus patient's age and psychometric parameters
In AD patients, no significant correlations ($p < 0.01$) between the NFL values and age or psychometric parameters (MMSE, ADAS, IVM) were observed.

48

Morpho-functional retinal changes: CADASIL

Early visual function impairment in CADASIL

V. Parisi, MD; F. Pierelli, MD; F. Fattagosta, MD; F. Bianco, MD; L. Parisi, MD; R. Restuccia, PhD; A. Malandrini, MD; M. Ferrari, MD; and P. Carrara, PhD

Abstract—The authors carried out genetic analyses and visual electrophysiological evaluations in six asymptomatic sons and daughters of patients with symptomatic cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL). Three subjects showed *Notch3* Cys146Tyr missense mutation and a dysfunction of the outer, middle, and innermost retinal layers, with normal neural conduction in postretinal visual pathways, whereas in the remaining subjects without genetic mutations, no electrophysiological abnormalities were found. An early vascular retinal impairment in CADASIL may precede the onset of clinical manifestations.

NEUROLOGY 2006;66:399–407

Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is a disease caused by mutations of the *Notch3* gene, located on chromosome 19¹ and is characterized by a nonatherosclerotic, nonamyloid cerebral angiopathy mainly affecting the small arteries penetrating the white matter.²

It was recently observed that asymptomatic patients

KEYWORDS: CADASIL, Notch3 mutation, OCT, field

Received 1 February Accepted 13 March

Visual electrophysiological responses in subjects with cerebral autosomal arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL)

Vincenzo Parisi^{1,2,3,4}, Francesco Pierelli^{1,2,3,4}, Alessandra Malandrini^{1,2,3,4}, Paola Carrara^{1,2,3,4}, Diego Orzi^{1,2,3,4}, Daniela Giganti^{1,2,3,4}, Rita Restuccia^{1,2,3,4}, Ludovica Parisi^{1,2,3,4}, Francesco Fattagosta^{1,2,3,4}

49

Morpho-functional retinal changes: CADASIL

Reduction of optic nerve fiber layer thickness in CADASIL

V. Parisi^{1,2,3,4}, F. Pierelli^{1,2,3,4}, G. Coppola^{1,2,3,4}, R. Restuccia^{1,2,3,4}, D. Ferrazzo^{1,2,3,4}, C. Scassa^{1,2,3,4}, F. Bianco^{1,2,3,4}, L. Parisi^{1,2,3,4}, and F. Fattagosta^{1,2,3,4}

¹U.S. Center for Prevalence and Control, Department of Neurobiology of Vision and Neuroimaging, Rome, Italy; ²University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy; ³IRCCS Fondazione Santa Lucia, Rome, Italy; ⁴Department of Neurology and Neurosurgery, Rome, Italy

Keywords: CADASIL, Notch3 mutation, OCT, field

Received 1 February Accepted 13 March

Figure 1 Circular optical coherence tomography (OCT) taken in cylindrical sections of tissue surrounding the optic disc. The most anterior red reflection indicates the nerve fiber layer (NFL). Compared to control eyes, OCT image of subject IB-2 (right eye) shows a marked decrease of NFL reflection (lower NFL thickness) in each quadrant.

50

Morpho-functional retinal changes: Ataxia

Journal of Clinical Medicine

MDPI

Article

Macular Morpho-Functional and Visual Pathways Functional Assessment in Patients with Spinocerebellar Type 1 Ataxia with or without Neurological Signs

Lucia Ziccardi^{1,2}, Ettore Cluffi^{1,2}, Lucilla Barbano^{1,2}, Valeria Gioiosa², Benedetta Fabiani^{2,3}, Carlo Casali² and Vincenzo Parisi¹

Therefore, the main aim of our work was to evaluate whether the macular functional and morphological abnormalities could be detectable in SP, genetically confirmed and with neurological signs, as well as in SCA-ATXN1-NSC, harboring pathogenic CAG expansion in *ATXN1*. In addition, we investigated whether the macular involvement could be associated or not to an impairment of RGCs and of their fibers and of the neural conduction along the visual pathways.

51

Morpho-functional retinal changes: Ataxia

OCT scans

mERG visual stimuli

R1: 0°–2.5° R2: 2.5°–5°
R3: 5°–10° R4: 10°–15°
R5: 15°–20°

52

Morpho-functional retinal changes: Ataxia

In four eyes of two SP, visual acuity reduction and chromatic abnormalities were observed; in three of them FO changes associated with macular thinning and outer retinal defects were also detected.

In three NSC eyes, slight FO abnormalities were associated with qualitative macular morphological changes. By contrast, abnormal mERG responses (exclusively from foveal and parafoveal areas) were detected in all SP and NSC (18 eyes).

No abnormalities of PERG values, RNFL-T, and VEP responses were found, but in one SP, presenting abnormal papillo-macular bundle neural conduction.

Results from our SCA-ATXN1 cohort suggest that a macular dysfunction, detectable by mERG recordings, may occur in the overt disorder, and unexpectedly in the stage of the disease in which there is still an absence of neurological signs.

In NSC, an exclusive dysfunction of preganglionic macular elements can be observed, and this is associated with both normal RGCs function and neural conduction along the visual pathways.

53

ESPLORAZIONE ELETTOFUNZIONALE DI AREE LOCALIZZATE RETINICHE:

- ERG multifocale
- PhNR multifocale

54

Problema principale:

Spot luminoso sul nervo ottico registriamo ERG?

NO non si sono fotorecettori

.....invece.... REGISTRIAMO ERG

Bulbo oculare: Cupola riflettente

stray-light

55

Problema principale:

Asher (J.P. 1965) e Boynton e Riggs (J.P. 1951) dimostrarono che un piccolo spot luminoso, se orientato sul disco ottico, produceva un ERG la cui ampiezza era eguale o lievemente superiore rispetto a quello ottenibile quando lo stesso spot era orientato sulla fovea.

SI PUO' REGISTRARE UNA RISPOSTA BIOELETTRICA DA AREE RETINICHE LOCALIZZATE?

- Risolvere i problemi legati al fenomeno della stray-light

Impiegare uno stimolo test circondato da un background luminoso adattante.

56

ERG Multifocale: stimolo visivo e risposta elettrofunzionale

57

ERG MULTIFOCALE NORMALE

58

Mappa della funzionalità retinica

59

ERG Multifocale: Generatori

Quali sono i generatori retinici della componente NI-P1?

Assessing retinal function with the multifocal technique. Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2000 Sep;19(5):607-46.

Coni e bipolari off

60

Applicazioni Cliniche

- AMD
- CNV Miopica
- Retinite Pigmentosa
- Glaucoma

NO CON CATARATTA, PATOLOGIE
CONCOMITANTI, MANCANZA DI FISSAZIONE

mERG e AMD:

1. Correlazioni elettrofisiologia/psicofisica
2. Correlazioni elettrofisiologia/morfologia
3. Utilità per la valutazione efficacia terapie

61

63

mERG e AMD:

1. Correlazioni elettrofisiologia/psicofisica
2. Correlazioni elettrofisiologia/morfologia
3. Utilità per la valutazione efficacia terapie

65

62

64

66

Sulla sinistra si osserva la rappresentazione topografica della risposta bioelettrica all'elettroretinogramma multifocale (mfERG) ottenuta nei 15° di eccentricità dalla fovea in un occhio controllo e in due occhi affetti da iAMD. Sulla destra sono rappresentate le tracce del mfERG ottenute nei 5 Ring centrali [R1 (0°-2,5°), R2 (2,5°-5°), R3 (5°-10°), R4 (10°-15°)] in un occhio controllo e in due occhi affetti da iAMD. Si osserva nei pazienti affetti da iAMD una riduzione della RAD ed un aumento della latenza IT.

67

mfERG	ANOVA Student's t-Test		
	Mean	SD	P (t, 40)
R1 PI ET, mean	13.81	2.56	
SD	10.91	2.50	
iAMD	10.36	1.55	0.005
R1 PI ET, mean	30.30	5.51	<0.001
SD	25.32	13.82	
iAMD	20.51	14.15	<0.001
R2 PI ET, mean	17.12	2.72	
SD	10.51	2.61	
iAMD	10.52	1.47	<0.001
R2 PI ET, mean	37.31	6.40	<0.001
SD	26.39	11.41	
iAMD	25.39	5.11	<0.001
R3 PI ET, mean	15.12	2.64	
SD	10.51	2.59	
iAMD	10.51	1.47	<0.001
R3 PI ET, mean	32.12	2.87	<0.001
SD	20.12	2.19	
iAMD	21.12	5.11	<0.001
R4 PI ET, mean	10.51	1.47	
SD	10.51	2.56	
iAMD	10.51	1.47	<0.001
R5 PI ET, mean	10.51	1.47	
SD	10.51	2.56	
iAMD	10.51	1.47	<0.001

RISULTATI FUNZIONALI
 Confrontando i valori medi IT e RAD ottenuti nei pazienti iAMD verso i Controlli si evidenzia:

- **Riduzione della funzione nell'area foveale (Ring 1)** ovvero tra 0°-2,5° dal centro della fovea.
- **Riduzione della funzione nell'area parafoveale (Ring 2)** ovvero tra 2,5°-5° dal centro della fovea.
- **Riduzione della funzione nell'area foveale + parafoveale (Ring 1 + Ring 2)** ovvero tra 0°-5° dal centro della fovea.
- **No differenze statisticamente significative nelle regioni più esterne alla fovea (Ring 4 e Ring 5)** ovvero tra 5°-10° e tra 10°-15°

68

RISULTATI MORFOLOGICI

SD-OCT:

- Lo spessore ed il volume centrale e parafoveale dell'epitelio pigmentato retinico (C-RPE, P-RPE) ed il volume della retina esterna parafoveale (P-ORV) **risultano significativamente aumentati** negli iAMD rispetto a C.
- I restanti parametri di spessore e volume misurati nei differenti strati retinici foveali e parafoveali non risultano significativamente alterati nei iAMD rispetto a C.

EDI-OCT:

- L'indice di vascolarizzazione coroidale (CVD) **risulta aumentato** nella regione foveale (1mm) e parafoveale (3 mm) negli iAMD rispetto a C.

OCTA:

- La densità vascolare (VD) del plesso capillare superficiale (SCP) e profondo (DCP) **non mostra differenze statisticamente significative** negli iAMD rispetto a C.
- La VD della Coriocapillare (CC) misurata sia nella regione foveale che parafoveale, **risulta significativamente ridotta** negli iAMD rispetto ai C.
- **No differenze statisticamente significative** nella misurazione della zona avascolare foveale (FAZ) tra iAMD e C.

69

MORFOLOGICI	CORRELAZIONI			
	mfERG IT	mfERG RAD	EDI-OCT CVD	OCTA CC
IT	0.001	0.001	0.001	0.001
RAD	0.001	0.001	0.001	0.001
CVD	0.001	0.001	0.001	0.001
CC	0.001	0.001	0.001	0.001

RISULTATI DELLE CORRELAZIONI MORFO-FUNZIONALI

CONCLUSIONS. Our findings support a dysfunction of photoreceptors and bipolar cells in both foveal and parafoveal areas in the presence of outer retina, CC, and choroidal structural changes, however, not significantly correlated. The observed enlargement of luminal choroidal area (measured by CVD) is possibly compensatory to CC vascular insufficiency.

Non si osservano correlazioni statisticamente significative tra i parametri morfologici (SD-OCT, EDI-OCT, OCTA) e funzionali (mfERG IT e mfERG RAD) di aree retiniche corrispondenti.

70

mfERG e AMD:

1. Correlazioni elettrofisiologia/psicofisica
2. Correlazioni elettrofisiologia/morfologia
3. **Utilità per la valutazione efficacia terapie:**
 - a) **Carotenoidi**
 - b) **Terapie intravitreali**

71

mfERG: VARIABILITA'

COME STUDIARLA E PER COSA PUO' ESSERE UTILE

1) Test-Retest

a) Almeno due misurazioni nell'arco della giornata
 b) Misurare le differenze (log μV)

Es: paz 1 = - 0.21 log μV
 paz 2 = + 0.18 log μV
 paz 3 = + 0.23 log μV
 paz 4 = - 0.19 log μV

Media 0.01, ± 2 SD (0.24)
Variabilità da - 0.47 log μV a + 0.49

72

73

1) Carotenoidi

Carotenoids and Antioxidants in Age-Related Maculopathy Italian Study
Multifocal Electroretinogram Modifications after 1 Year

Ophthalmology 2008; 115:324-333 © 2008 by the American Academy of Ophthalmology

Vincenzo Parisi, MD,¹ Maximiliano Teleschi, MD,¹ Gerardo Galliano, BS,² Monica Varano, MD,¹ Sandro Santoro, MD,² Stefano Perrone, MD,² CARMES Study Group^{1,2}

Objective: To evaluate the influence of short-term carotenoid and antioxidant supplementation on retinal function in nonadvanced age-related macular degeneration (AMD).

Methods: Multifocal electroretinograms in response to 61 M-stimuli presented to the central 20° of the visual field were assessed in pretreatment (baseline) conditions and, in nonadvanced AMD patients, after 6 and 12 months.

Adv Ther (2019) 36:2493-2505
<https://doi.org/10.1007/s12325-019-01016-2>

Effects of Macuprev[®] Supplementation in Age-Related Macular Degeneration: A Double-Blind Randomized Morpho-Functional Study Along 6 Months of Follow-Up

Mariacristina Parravano · Maximiliano Teleschi · Daniela Manca · Eliana Costanzo · Antonio Di Russo · Paola Giorno · Lucilla Barbano · Lucia Zaccari © · Monica Varano · Vincenzo Parisi

Background: To evaluate the effects of Macuprev[®] supplementation on macular function and structure in intermediate age-related macular degeneration (AMD) along 6 months of follow-up.

74

Adv Ther (2019) 36:2493-2505
<https://doi.org/10.1007/s12325-019-01016-2>

Pazienti

- N= 30 pazienti
- Early AMD, categoria 3 dello studio AREDS
- ETDRS $\geq$ 0.2 LogMAR

- Suddivisi Random in due gruppi paragonabili per età e grado di AMD
- N=15, AMD-M: Trattati, età media: 68.5±8.79 anni;** supplementazione orale di cocktail con antiossidanti (Macuprev, Farmaplus Italia s.r.l., Italy).^{*} 2 cps/giorno per 6 mesi
- * (costituenti: lutein (20 mg), zeaxanthin (4 mg), N-acetylcysteine (140 mg), bromelain 2500GDU (80 mg), vitamin B12 (18 mg), vitamin D3 (800 IU), alphalipoic acid (140 mg), rutin (157 mg), vitamin C (160 mg), zinc oxide (16 mg), Vaccinium myrtillus 36% anthocyanosides (90 mg), Ganoderma lucidum (600 mg)
- N= 15 AMD- Placebo, età media: 70.1±9.87 anni;** 2 cps/giorno per 6 mesi

75

Risultati:

esempi di risposte individuali di mfERG in occhi AMD-P e AMD-M

76

77

78

79

2) Trattamenti intravitreali

Doc Ophthalmol (2013) 127:217–225
DOI 10.1007/s10633-013-9404-z

Single-session photodynamic therapy combined with intravitreal ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: a comprehensive functional retinal assessment

Mariacristina Parravano · Vincenzo Parisi · Lucia Ziccardi · Adele Chiaravalloti · Massimiliano Tedeschi · Andrea Cacciamani · Barbara Bocassini · Antonluca Boninfante · Monica Varano

Purpose To explore functional retinal changes in neovascular AMD patients (nAMD) treated with ranibizumab 0.5 mg combined with photodynamic therapy (PDT) 3 days after the first injection in the long term.

80

81

Conclusioni

mfERG e AMD:

1. Identificazioni di disfunzioni precoci nell'area foveale
2. Modificazioni del mfERG correlate con psicofisica (microperimetria), ma non con OCT/A-OCT
3. Utilità per la valutazione efficacia terapie

82

83

Nei pazienti con RP si ha la possibilità di rilevare aree retiniche “ancora” funzionanti e di quantificarne la funzionalità residua in maniera oggettiva.

- Particolare utilità nella valutazione funzionale residua della regione maculare

84

Soggetto: Di Ma 44 anni, CNV miopica, OD

85

Soggetto: Di Mi 54 anni, CNV miopica, OD

86

www.isceve.org Standards Links
 SYMPOSIA CONFERENCES About
 Newsletter Memberships etc.

ISCEV

Standards, Recommendations and Guidelines

mfERG (= multifocal ERG)
 Hood DC, Bach M, Brigell M, Keating D, Kondo M, Lyons JS, Marmor MF, McCulloch DL and Palmowski-Wolfe AM (2012) ISCEV Standard for clinical multifocal electroretinography (2011 edition). Doc Ophthalmol 124 1–13
 mfERG Standard (Springer) | local copy [PDF]

ERG
 Marmor MF, Fulton AB, Holder GE, Miyake Y, Brigell M, Bach M (2009) Standard for clinical electroretinography (2009 update). Doc Ophthalmol 116:69–77
 ERG Standard (Springer) | local copy [PDF]

EOG
 Marmor MF, Brigell MG, Westall CA, Bach M. ISCEV Standard for Clinical Electro-oculography (2010 Update). Doc Ophthalmol (2011) 122:1–7
 EOG Standard (Springer) | local copy [PDF]

PERG (= Pattern ERG)
 Bach M, Brigell MG, Hawina M, Holder GE, Johnson MA, McCulloch DL, Mergen T, Viswanathan S (2013) ISCEV standard for clinical pattern electroretinography (PERG) – 2012 update. Doc Ophthalmol 124 1–13 [DOI]
 PERG Standard (Springer) | local copy [PDF]

VEP
 Odum JV, Bach M, Brigell M, Holder GE, McCulloch DL, Tormene AP, Vaegan (2010). ISCEV standard for clinical visual evoked potentials(2009 update). Doc Ophthalmol 120 111–119
 VEP Standard (Springer) | local copy [PDF]

87

PhNR Multifocale: stimolo visivo e risposta elettrofunzionale

88

PhNR Multifocale: può riflettere disfunzioni della retina interna di aree retiniche localizzate?

Article

Multifocal electroretinogram Photopic Negative Response: a reliable paradigm to detect localized retinal ganglion cells' impairment in retrobulbar optic neuritis due to multiple sclerosis as a model of retinal neurodegeneration

Lucilla Barbanò¹, Lucia Ziccardi², Giulio Antonelli³, Carolina Gabri Nicoletti⁴, Dorianna Landi⁵, Giorgia Mataluni⁶, Benedetto Falsini⁷, Girolama Alessandra Martia⁸, Diego Centonze^{9,10} and Vincenzo Parisi¹

PhNR Multifocale: può riflettere disfunzioni della retina interna di aree retiniche localizzate?

The mfPhNR RAD values observed in all rings or sectors in MS-ON eyes were significantly reduced ($p < 0.01$) with respect to control ones. Our results suggest that mfPhNR recordings may detect localized IRL dysfunction in the pathologic condition of selective RGCs neurodegeneration.

89

90

Il nervo Ottico

91

- Il *nervo ottico* (II paio di nervi cranici) non è un nervo nell'accezione abituale del termine, ma, morfologicamente e funzionalmente, una proiezione diencefalica.
- Costituito dall'insieme degli assoni delle cellule gangliari della retina, si estende da questa al chiasma ottico rivestito dalle sue guaine, dura madre, aracnoide e pia madre, che sono in continuità con quelle meninge.

92

LE VIE OTTICHE POST-CHIASMATICHE

93

Il Nucleo Genicolato laterale

- Sistema magno/parvo cellulare

Diviso in 6 strati: ipsi e controlaterale

94

Fisiologia della via nervosa visiva

95

Fisiologia della via nervosa visiva

96

Nucleo Genicolato laterale e visione binoculare

97

Nucleo Genicolato laterale e deficit della visione binoculare

98

Nucleo Genicolato laterale e deficit della visione binoculare

1) Rilascio di neurotrasmettitore ASINCRONO

Modificazioni della plasticità cerebrale:

- 1) anomala formazione di sinapsi
- 2) Anomala stabilizzazione sinaptica a lungo termine

99

NGL e Ampliopia

Published | ELON and anislopia

Format: Summary | Sort by: Most Recent | Per page: 20

Search results

Items 1 to 20 of 20

Molecular Vision
Biology and Genetics in Vision Research

Monocular visual deprivation in Macaque monkeys: A profile in the gene expression of lateral geniculate nucleus by laser capture microdissection

Shenolik, Ching^{1,2}, Wang, Xianmin², Tang, Qun², Liu, Zhun², Chen, Yuhua², Sun, J., Jiang², Zhang, Zhen², and Sobel, E. J.^{1,2*}

Figure 1: Histological images of NGL and LGN in control and LON mice.

100

Plasticità cerebrale: ruolo del NGF

Journal of Neurophysiology 1993, 69, 243-250

243

EFFECTS OF NERVE GROWTH FACTOR ON NEURONAL PLASTICITY OF THE KITTEN VISUAL CORTEX

By GIORGIO CARMIGNOTO, ROBERTO CAPELLA, PAOLA CANTO, MARIA CRISTINA COIRELLI, and LAMBERTO MAFFEI*

1. The effect of intravitreal administration of nerve growth factor (NGF) by means of a cannula into the visual cortex was studied in kittens monocularly deprived during the critical period. The number of neurons of area 17 evoked by NGF-treated and control kittens was determined by cross-correlational microstimulation. The mean area of cells in A and B laminae of the lateral geniculate nucleus (LGN) was also estimated by ChR2-Violet preparation.

2. Monocularly deprived kittens were found to be significantly more responsive to NGF-treated than in control kittens. The advantage of cells from the deprived LGN laminae normally observed in control kittens was prevented by NGF administration.

3. Following an initial period of monocular deprivation (MD) kittens subsequently treated with NGF showed a substantial recovery of functional binocular connections.

4. These findings indicate that the administration of NGF during the period of deprivation induces the anisotropic effect of MD, while its administration to kittens with both eyes open following the initial deprivation promotes recovery of the deprived eye.

5. Neurotrophic factors may contribute to the regulation of experience-dependent modifications of synaptic connectivity in the visual cortex.

101

Plasticità cerebrale: ruolo dell'ambiente

Research Article

Environmental Enrichment Induces Changes in Long-Term Memory for Social Transmission of Food Preference in Aged Mice through a Mechanism Associated with Epigenetic Processes

Simona Cristofari^{1,2}, Maria Cristina Casati¹, Bruno Piana^{1,2}, Silvio Morone¹, Alessandro Sola¹, Lamberto Maffei^{1,2}, and Nicoletta Berardi^{1,2*}

1. The effect of an enriched environment (EE) on the ability of aged mice to learn from social transmission of food preference was studied. Mice were divided into four groups: control (C), EE (E), deprived (D), and EE+D (EED). Mice were trained to learn from social transmission of food preference. The results showed that EE mice learned faster than control mice, and that EE+D mice learned faster than D mice. The results also showed that EE mice had higher levels of DNA methylation in the hippocampus, suggesting a role for epigenetic processes in the learning process.

102

Corteccia deficit della visione binoculare

1) Rilascio di neurotrasmettitore ASINCRONO

DEFICIT VISIONE BINOCULARE

Amblyopia (AM) is a disorder of the visual system, characterized by reduced visual function in one eye, that has been estimated to affect 1% to 5% of the population.¹ The disorder is associated with strabismus, anisometropia, or a form of deprivation early in life.²⁻⁶
(Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51:5041-5048)

3) Minor Rilascio di Fattori neurotrofici all'occhio deprivato (NGF, BDNF...) "Competizione per il fattore neurotrofico"

103

La Corteccia Visiva

104

La corteccia visiva

J. Physiol. (1962), **148**, pp. 146-154
 With 2 plates and 21 text-figures
 Printed in Great Britain

RECEPTIVE FIELDS, BINOCULAR INTERACTION AND FUNCTIONAL ARCHITECTURE IN THE CAT'S VISUAL CORTEX

By D. H. HUBEL and T. N. WISEL

From the Neurophysiology Laboratory, Department of Pharmacology, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, U.S.A.

(Received 31 July 1961)

What chiefly distinguishes cerebral cortex from other parts of the central nervous system is the great diversity of its cell types and interconnections. It would be astonishing if such a structure did not profoundly modify the response patterns of those coming into it. In the cat's visual cortex, the receptive field arrangements of single cells suggest that there is indeed a degree of complexity for exceeding anything yet seen at lower levels in the visual system.

- Aree occipitali 17, 18, 19
- Rappresentazione retinotopica
- Cellule semplici, complesse, ipercomplesse
- Le colonne di dominanza oculare

105

Cellule semplici, complesse ipercomplesse

106

Colonne di Dominanza Oculare

107

Colonne di Dominanza Oculare, Deprivazione, NGF, Plasticità

108

Colonne di Dominanza Oculare, Strabismo, NGF, Plasticità

Neuroscience, Vol. 53, No. 1, pp. 19-26, 1992
Printed in Great Britain

EXOGENOUS SUPPLY OF NERVE GROWTH FACTOR PREVENTS THE EFFECTS OF STRABISMUS IN THE RAT

L. DOMENICI, F. V. PARIKAT and L. MAFFIOTTI
Istituto di Neurofisiologia del CNR, Via S. Zeno 31, 50127 Pisa, Italy
Scuola Normale Superiore, Pisa, Fidia Research Laboratories, Abano Terme, Italy

Fig. 1. Ocular dominance distribution of visual cortical neurons recorded in the binocular portion of area 17 (area OC18) in normal rats (A, 161 cells), strabismic rats (B, 161 cells), strabismic NGF-treated rats (C, 171 cells) and in cytochrome C-treated rats (D, 93 cells). In strabismic rats the visual cortex was recorded in the cortex contralateral to the strabismic eye. Normal rats show that 1-term neurons and drives only by the stimulation of the contralateral eye, whereas of strabismic 2 and 3-term neurons and preferentially drives to the contralateral eye, whereas of strabismic and equally driven by the two eyes, neurons of strabismic 4 and 5-term neurons and preferentially drives to the ipsilateral eye and neurons of 1-term neurons and drives only to the ipsilateral eye. The ranges indicated in strabismic rats represent the range that could be considered as normal. Differences in ocular dominance distribution assessed in different groups of rats were examined by means of chi-square test; strabismic normal rats vs normal rats ($P < 0.01$); strabismic normal vs strabismic cytochrome C-treated rats, $P > 0.05$; normal vs strabismic NGF-treated rats, $P > 0.05$.

109

Acuità visiva, Deprivazione, NGF, Plasticità

L. Domenici, N. Bignardi, G. Campanelli, G. Viorini, BPG L. Maffiotti
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88 (1991) 8813
1991 Oct 1; 88(19): 8811-8815
PNAS
Department of the National Academy of Sciences of the United States of America
Nerve growth factor prevents the amblyopic effects of monocular deprivation.

Supplementazione di NGF
(Riattivazione Plasticità)
↓
Attivazione del NGL
↓
Riduzione deficit visivo

110

Corteccia deficit della visione binoculare

111

ESPLORAZIONE FUNZIONALE DELLE VIE OTTICHE: I POTENZIALI EVOCATI VISIVI

I POTENZIALI EVOCATI VISIVI (PEV):

variazioni dei potenziali bioelettrici della corteccia occipitale evocati da stimoli visivi.

Manifestazione di raffinati e complessi eventi neurosensoriali legati a fenomeni di **traduzione** e **trasmissione** dell'impulso nervoso lungo le vie visive, cioè dai fotorecettori retinici fino alla corteccia cerebrale occipitale.

INTERNATIONAL SOCIETY FOR CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY OF VISION
Doc Ophthalmol (2016) 133:1-9
ISCEV standard for clinical visual evoked potentials: (2016 update)
J. Vernon Odom · Michael Bach · Mitchell Brigell · Graham E. Holder · Daphne L. McCulloch · Atsushi Mizota · Alma Patrizia Tormene ·

112

1) PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Posizionamento degli elettrodi

RESISTENZA INTERELETTRODICA < 3 KOhms

Electrode montage (international 10/20 channel system)		Filters (–3 dB)		
Active	Common reference	Low freq	High freq	Sweeps averaged
Pattern stimulation Oz	Fz	≤1	≥100	≥50

113

1) PREPARAZIONE DELL'ESAME

Posizionamento degli elettrodi NEL PREAMPLIFICATORE

Traccia con polarità positiva in basso/alto:

MOLTO IMPORTANTE PER EVITARE ERRORI DI VISUALIZZAZIONE DEI PICCHI

114

2) LO STIMOLO VISIVO

A) Frequenza spaziale B) Frequenza temporale C) Contrasto

A) Frequenza spaziale: è angolo sotteso dal singolo elemento del pattern, per cui viene calcolata in relazione alla dimensione del singolo elemento (barre- gratings o scacchi-checks) ed alla distanza del soggetto in esame.

a 57 cm: diagonale di 1 cm sottende 1° = 60'

a 114 cm: diagonale di 2 cm sottende 1° = 60'

a 114 cm: diagonale di 0.5 cm sottende ¼ di 1° = 15'

Stimulus type	Field size (degrees)	Presentation	Stimulus	Mean luminance (cd. m ⁻²)	Modulation contrast (%)	Presentation rate
Pattern reversal	15°	Monocular	Check width: 1° (0.6°-1.2°), (0.25°-0.5°)	50 (40-60)	0.90	2 (1.8-2.2) reversals/s

115

2) LO STIMOLO VISIVO

C) Contrasto: $L_{max}-L_{min}/L_{min}+L_{max} \times 100$

Per cui se abbiamo un elemento bianco con massima luminanza (100) ed un elemento nero con minima luminanza (0) il contrasto è del 100%.
In realtà, l'elemento bianco non ha mai una luminanza 100, per cui viene sempre utilizzato un contrasto reale del 70-80%.

Lum max

Lum min

Il contrasto viene definito ad "onda quadra" se il passaggio dalla luminanza dell'elemento bianco a quello nero (sia esso barra o scacchi) avviene in maniera netta, mentre viene definito ad "onda sinusoidale" se il passaggio dalla luminanza dell'elemento bianco a quello nero (sia esso barra o scacchi) avviene in maniera graduale.

L'uso dei gratings è molto importante nei casi in cui non si conosceva della corretta AV

116

3) Risposta e stimolo visivo: fonti di errore legati al difetto refrattivo

CHECKS,

V.P. 59 anni -2sf=-3 cyl (165)
AV non corretta

A.T 36 anni LHON AV corretta

GRATINGS

V.P. 59 anni -2sf=-3 cyl (165)
AV non corretta

A.T 36 anni LHON AV corretta

117

3) Le risposte bioelettriche corticali

60° AV

Indicare sempre la polarità

15° AV

PEV: soggetto normale

Valutazione funzione degli assoni di grosso calibro
 Valutazione funzione del fascio papillo-maculare
Electrophysiological Detection of Delayed Postnatal Neural Conduction in Human Anisotropic Optic Nerve

Basse frequenze spaziali (60°): risposta più "rapida" → assoni con più rapida velocità di conduzione → assoni di grosso calibro

Alte frequenze spaziali (15°): risposta + ritardata → assoni con più lenta velocità di conduzione → assoni di piccolo calibro

118

4) APPLICAZIONI CLINICHE

PEV con latenze aumentate ed ampiezze ridotte:

Normale

Patologico

CHECKS 60° CONTRASTO 70%

CHECKS 15° CONTRASTO 70%

range di normalità

Disfunzione retinica, del nervo ottico, del chiasma, del tratto ottico.....ecc?

119

ESPLORAZIONE ELETTOFUNZIONALE DELLE VIE OTTICHE POSTRETINICHE

120

PEV: latenze aumentate/ampiezze ridotte:

Diagnosi differenziale tra:

- Patologie retiniche
 - Patologie postretiniche
- E' necessario associare:**
- PEV + ERG PEV + PERG

121

PEV+ ERG

patologia post-fotorecettoriale:
 cellule ganglionari, nervo ottico, vie ottiche

122

PEV+ ERG

Patologia fotorecettoriale che determina un ritardo della conduzione nervosa lungo le vie ottiche

123

PEV+ PERG: il Tempo Retino-Corticale

PEV P100 Tempo Implicito:
 Risposta bioelettrica corteccia visiva

PERG P50 Tempo Implicito ed Ampiezza:
 risposta bioelettrica delle cellule ganglionari

Differenza PEV P100- PERG P50 Tempi Impliciti è indicato come "Tempo Retinocorticale (TRC)" (indice elettrofisiologico della conduzione nervosa tra le cellule ganglionari e corteccia visiva).

Celesta et al. IOVS, 1985.

124

1) PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Posizionamento degli elettrodi

Stimolazione monocolare

125

1) PREPARAZIONE DELL'ESAME

Posizionamento degli elettrodi NEL PREAMPLIFICATORE

Traccia con polarità positiva in basso per il PEV

Traccia con polarità positiva in alto per il PERG

MOLTO IMPORTANTE PER EVITARE ERRORI DI VISUALIZZAZIONE DEI PICCHI

126

127

POSSIBILI COMBINAZIONE DI RISPOSTE BIOELETTRICHE PERG+PEV

128

1 PEV e PERG con impliciti ed ampiezze normali, TRC nella norma

129

2 60' e 15' PEV P100 tempi impliciti aumentati ed ampiezze normali, PERG tempi impliciti aumentati ed ampiezze ridotte ed TRC normali

130

3 60' e 15' PEV P100 tempi impliciti aumentati ed ampiezze normali, PERG tempi impliciti ed ampiezze normali, TRC aumentati

131

4 1. 60' PEV P100 tempi impliciti aumentati ed ampiezze normali, PERG tempi impliciti ed ampiezze normali, TRC aumentati 2. 15' PEV P100 tempi impliciti ed ampiezze normali, PERG tempi impliciti ed ampiezze normali, TRC normali

132

- 5**
- 60° PEV P100 tempi impliciti ed ampiezze normali, PERG tempi impliciti ed ampiezze normali, TRC normali
 - 15° PEV P100 tempi impliciti aumentati ed ampiezze normali, PERG tempi impliciti ed ampiezze normali, TRC aumentati

Considerazioni neurofunzionali
 OO: Funzionalità degli strati interni retinici (cellule e fibre ganglionari) nella norma
 OO: Si rileva ritardo della conduzione nervosa post-retinica esclusivamente lungo gli assoni di piccolo calibro (OD=OS); conduzione nervosa post-retinica degli assoni di grosso calibro limiti della norma.

133

- 6**
- 60° e 15° PEV P100 tempi impliciti aumentati ed ampiezze normali, PERG tempi impliciti aumentati ed ampiezze ridotte, TRC aumentati

Considerazioni neurofunzionali
 OO: Si rileva disfunzione degli strati interni retinici (cellule e fibre ganglionari) (OD=OS)
 Si rileva ritardo della conduzione nervosa post-retinica sia lungo gli assoni di grosso calibro (OD=OS) che lungo gli assoni di piccolo calibro (OD=OS).

134

- ## Applicazioni cliniche
- Ipertensione oculare
 - Glaucoma
 - Sclerosi multipla con NORB
 - Sclerosi Multipla no NORB
 - Ambliopia
 - NOIA
 - LHON

135

1 IPERTENSIONE OCULARE:

Considerazioni neurofunzionali
 Si rilevano alterazioni funzionali degli strati interni retinici (cellule e fibre ganglionari).
 Conduzione nervosa post-retinica nei limiti della norma sia lungo gli assoni di grosso calibro che lungo gli assoni di piccolo calibro

Stimolo checks 15°; FT 2 Hz; Contrasto 70 %

PERG RIDOTTO, VEP RITARDATO E TRC NELLA NORMA

136

2 GLAUCOMA

PERG RIDOTTO, VEP RITARDATO TRC: AUMENTATO IN PROPORZIONE ALLA RIDUZIONE DEL PERG, CORRELATO CON LA MD, NON CORRELATO CON RNFL

137

3 SCLEROSI MULTIPLA CON NORB

PERG RIDOTTO, VEP RITARDATO TRC AUMENTATO NON PROPORZIONE ALLA RIDUZIONE DEL PERG, NON CORRELATO CON RNFL

138

PERG NORMALE, VEP RITARDATO E TRC AUMENTATO

60 o 15' di stimolazione
PERG RIDOTTO, VEP RITARDATO
TRC: AUMENTATO
NON PROPORZIONE ALLA RIDUZIONE DEL PERG,
NON CORRELATO CON RNFL

139

60' di stimolazione
PERG VEP E TRC NELLA NORMA

15' di stimolazione
PERG: NELLA NORMA, VEP: RITARDATO,
TRC AUMENTATO

LA DIFFERENZA INTEROCULARE DEL TRC
CORRELATA CON LA DIFFERENZA INTEROCULARE AV

140

PERG RIDOTTO, VEP RITARDATO

TRC: AUMENTATO IN PROPORZIONE ALLA
RIDUZIONE DEL PERG, CORRELATO CON LA MD,
CORRELATO CON RNFL

141

Simulazione a 60' e 15'
PERG RIDOTTO sia negli AFFETTI che nei
CARRIER
VEP: RITARDATO negli AFFETTI,
normale nei CARRIER
TRC: AUMENTATO negli AFFETTI,
normale nei CARRIER

142

Evidenze Scientifiche

- Electrophysiological assessment of visual function in IDDM patients: Visual evoked potentials, pattern ERG, and pattern reversal VEP. *Vincenzo Parisi, Luigi Luciani, Giovanna Montecchi, Ludovica Parisi, Gianluca Masera, Daniela Spina, Guido Mascherano, Massimo G. Bruzzi*
- Neural conduction in the visual pathways in newly-diagnosed IDDM patients. *Vincenzo Parisi, Luigi Luciani, Ludovica Parisi, Giuseppe Calceola, Gianluca Masera, Guido Mascherano, Massimo G. Bruzzi*
- Delayed postretinal neural conduction in glaucoma patients: Correlations between electrophysiological and computerized static perimetry parameters. *V. Parisi, G. L. Masera, G. Spina, G. Calceola, M. Corbelli, M. G. Bruzzi*
- Correlations between optical coherence tomography, pattern ERG and visual evoked potentials in patients with ocular hypertension and open angle glaucoma. *G. L. Masera, V. Parisi, S. A. Giordano, M. Corbelli, G. Calceola, S. Manzi, M. G. Bruzzi*
- Visual function correlates with Nerve Fiber Layer Thickness in Eyes Affected by Ocular Hypertension. *Vincenzo Parisi, G. L. Masera, M. G. Bruzzi, D. Spina, A. Giordano, M. Corbelli, G. Calceola, S. Manzi, M. G. Bruzzi*
- Visual evoked potentials in subjects with central astigmatism and/or with bilateral refractive error and heterophthalmia (CADME). *Vincenzo Parisi, G. L. Masera, M. G. Bruzzi, D. Spina, A. Giordano, M. Corbelli, G. Calceola, S. Manzi, M. G. Bruzzi*
- Visual evoked potentials in glaucoma and in ocular hypertension: a study of 100 eyes. *Vincenzo Parisi, G. L. Masera, M. G. Bruzzi, D. Spina, A. Giordano, M. Corbelli, G. Calceola, S. Manzi, M. G. Bruzzi*
- Impaired visual function in glaucoma. *Vincenzo Parisi*
- Clinical Ability of Pattern Electroretinograms and Visual Evoked Potentials in Detecting Visual Dysfunction in Ocular Hypertension and Glaucoma. *Vincenzo Parisi, Luigi Luciani, Luigi Luciani, Massimo G. Bruzzi, Massimo G. Bruzzi*

143

- Electrophysiological assessment of visual function in patients with non-arteritic ischemic optic neuropathy. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina*
- Cytidine 5'-diphosphocholine (Citicoline) a pilot study in patients with non-arteritic ischemic optic neuropathy. *L. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina, M. G. Bruzzi*
- Electrophysiological assessment of visual function in patients with non-arteritic ischemic optic neuropathy. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina*
- Experimental and clinical evidence of neuroprotection by nerve growth factor eye drops: Implications for glaucoma. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina, M. G. Bruzzi*
- Visual evoked potentials in subgroups of migraine with aura patients. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina, M. G. Bruzzi*
- Effects of Citicoline Q10 in conjunction with Vitamin E on Retinal-evoked and Cortical-evoked Responses in Patients with Open-angle Glaucoma. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina, M. G. Bruzzi*
- Cytidine 5'-Diphosphocholine (Citicoline) in Glaucoma: Rationale of Its Use, Current Evidence and Future Perspectives. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina, M. G. Bruzzi*
- Neurotrophic and neuroprotective effects of oral solution citicoline in non-arteritic ischemic optic neuropathy as a model of neurodegeneration: A randomized pilot study. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina, M. G. Bruzzi*
- Functional Changes of Retinal Ganglion Cells and Visual Pathways in Patients with Chronic Latent Hereditary Optic Neuropathy during One Year of Follow-up. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina, M. G. Bruzzi*
- Visual Evoked Potentials in Jeune's Syndrome: A Suggested Useful Method for Evaluating Future Approaches Targeted to Improve Visual Pathways' Function. *V. Parisi, G. Calceola, L. Luciani, G. Spina, M. G. Bruzzi*
- Neural conduction along post-retinal visual pathways in glaucoma. *Vincenzo Parisi, Luigi Luciani, Luigi Luciani, Massimo G. Bruzzi, Massimo G. Bruzzi*

1997-2021
32 lavori pubblicati

144

145

146

Applicazioni Cliniche

- Retinite Pigmentosa
- Maculopatie
- Glaucoma
- Neuriti Ottiche

147

148

149

150

Leber's Optic Neuritis

Graphs, Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2015 Mar 17. [Open access of print]
Multifocal VEP provide electrophysiological evidence of predominant dysfunction of the optic nerve fibers derived from the central retina in Leber's hereditary optic neuropathy.
 Zoccolà L¹, Parisi V, Giannini D, Sadoni F, De Santis MI, Esposito F, La Morgia G, Sadoni AA, Capelli V

Greatest delay in the papillo-macular bundle

151

Quanto viene influenzata la risposta corticale da eventuali deficit localizzati retinici?
 Può esistere un meccanismo di plasticità o di rimodellamento cerebrale tale da incrementare la funzionalità retinica?

152

Quanto viene influenzata la risposta corticale da eventuali deficit localizzati retinici?

Metodo

RISPOSTE MULTIFOCALI

153

ERG Multifocale: stimolo visivo e risposta elettrofisologica

154

VEP Multifocale: stimolo visivo e risposta elettrofisologica

155

Modello umano di deficit funzionale retinico: retinite pigmentosa

malattia genetica dell'occhio caratterizzata dalla degenerazione degli elementi sensoriali (fotorecettori) e nervosi (cellule ganglionari della retina), con conseguente perdita del campo visivo

156

Clinical Neurophysiology
Journal homepage: www.elsevier.com/locate/clneph

Impact of regional retinal responses on cortical visually evoked responses: Multifocal ERGs and VEPs in the retinitis pigmentosa model

Vincenzo Parisi^a, Lucia Ziccardi^a, Giovanna Stifano^a, Lucrezia Montrone^a, Geltrude Gallinaro^a, Benedetto Falsini^{b,c}

^aNeurologia e U.O. Retine, Istituto di Neuroscienze e Centro di Ricerca in Neuroscienze (IRCCS) Istituto Romo Italy; ^bIstituto di Oftalmologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy; ^cUniversità di Pisa, Pisa, Italy

See Editorial, pages 270-271

ARTICLE INFO

Article history:
Accepted 28 September 2009
Available online 13 January 2010

Keywords:
mfERG
mfVEP
Photoreceptors
ON bipolar cells
Retinitis pigmentosa
Visual cortex

ABSTRACT

Objective: To determine the impact of the regional retinal responses on cortical visually evoked responses, by evaluating the relationship between multifocal ERG (mfERG) and multifocal VEP (mfVEP) in the retinitis pigmentosa (RP) model.

Methods: mfERGs and mfVEPs were recorded from 20 typical RP patients. Response amplitude density (RAD, nV/deg²) and implicit times (IT) of the mfERG 1st order binary kernel (N1-P1) and mfVEP 2nd order binary kernel (P1) components were measured. Ring analysis, matched for mfERG and mfVEP stimuli, was performed between fovea and mid periphery (0–2.5, 2.5–5, 5–10, 10–15 and 15–20 deg).

Results: At central and peripheral retinal regions (four eccentricities between 0 and 15 deg), mfERG N1 RADs were positively correlated ($r > 0.68, p < 0.01$) with corresponding mfVEP P1 RADs. Similarly, mfERG P1 implicit times were positively correlated ($r > 0.65, p < 0.01$) with corresponding mfVEP P1 implicit times.

Conclusions: There are quantitative correlations between mfERG and mfVEP components in RP. Significance: The data suggest that regional responses of the photoreceptors and all bipolar cells, the main generators of mfERG N1, have a major impact on the corresponding cortical activity.

© 2010 Elsevier Ireland Ltd. on behalf of International Federation of Clinical Neurophysiologists.

157

Patients

N = 20

Mean age: 36 yrs, range: 15–56

Median visual acuity: 20/25, range: 20/30 – 20/20

Goldmann visual field (V4/e target): mean field (major diameter): 45°, range 30–55

Fundus: typical RP appearance

Ganzfeld ERG (ISCEV standard)

Rod-mediated response	Non-recordable
Maximal response	Severely reduced amplitude (< 35% of the normal mean)
Single-flash cone-mediated response	Severely reduced amplitude (< 40% of the normal mean) & delayed implicit time (3–8 ms slower than the normal mean)
Flicker response	Severely reduced amplitude (< 40% of the normal mean)

Inheritance Mode

Dominant	N
Recessive	2
Isolated	3
X-linked	12
	3

158

159

160

CORRELAZIONI TRA AREE RETINICHE E LE RELATIVE PROIEZIONI CORTICALI:

5 LIVELLI DI ECCENTRICITA'

MERG MVEP

R1: 0-2.5 gradi
R2: 2.5-5 gradi
R3: 5-10 gradi
R4: 10-15 gradi
R5: 15-20 gradi

161

162

Editorial
Degeneration/re-organization coupling in retinitis pigmentosa

This groundbreaking approach allowed for the first time the investigators to show the presence of a tight correlation between local retinal function (mfERG response) and its cortical projection as probed with the mfVEPs. Specifically it was shown that a negative component of the mfERG first-order Kernel has a major impact on the mfVEP signal characteristics. The more severe the local retinal functional loss, the more profound the functional re-organization of cortical activity, suggesting that the cortical circuitry may undergo substantial remodelling following primary photoreceptor loss. The results warrant further studies to shed more light on the time course of degeneration/re-organization coupling in retinitis pigmentosa.

163

MODELLO RP:
 possibilità di rilevare aree retiniche
 “ancora” funzionanti e di quantificarne la
 funzionalità residua in maniera oggettiva.
**Correlazioni tra ERG e VEP multifocali:
 CORTECCIA VISIVA E’ IN GRADO DI
 RIMODELLARE LE INFORMAZIONI
 BIOELETTRICHE PROVENIENTI
 DALLA RETINA**

164

●
 forma, colore, dimensioni, contrasto,
 posizione nello spazio,...

165

Coautori degli studi presentati

Retinite pigmentosa
 Prof. Benedetto Falsini
 Dott.ssa Lina Gallinaro
 Dott.ssa Lucia Ziccardi
 Dott.ssa Giovanna Stifano

Pucker Maculari
 Dott. Guido Ripandelli
 Dott. Andrea Coppè
 Dott.ssa Lina Gallinaro
 Prof. Mario Stürpe

Glaucoma
 Prof. Gianluca Manni
 Prof. Marco Centofanti
 Dr.ssa Lina Gallinaro
 Dr.ssa Lucia Tanga
 Dr.ssa Lucia Ziccardi
 Prof. Massimo G. Bucci

CNV miopica e AMD
 Dott.ssa Monica Varano
 Dott.ssa Lina Gallinaro
 Dr.ssa Loredana Perillo
 Dr.ssa Nicoletta Capaldo
 Dr. Massimiliano Tedeschi

Neuroftalmologia
 Prof. Francesco Pierelli
 Prof. Leoluca Parisi
 Prof. Francesco Fattapposta
 Prof. Federico Bianco
 Dr.ssa Rita Restuccia

Grazie dell’attenzione!!!

166